

cloud, and the rustling of their tiny wings was distinctly heard by me a hundred yards off; they rose in a cupola-shaped mass, and were as thick as bees in a swarm; there must have been 30,000 or 40,000 birds on the wing at that moment, the Wagtails forming, as I estimated, about a third or fourth of the number.

The boy was called away, and soon all the birds descended before it was quite dark; when settled, the Swallows kept up an incessant simmering chirping for some time, but I could not hear a Wagtail's note at all.

The sight was a wonderful one; at daylight the birds all departed very quickly and quietly.

XXXI.—*Description d'une nouvelle Espèce du Genre*
Emberiza. Par L. TACZANOWSKI.

(Plate VIII.)

EMBERIZA JANKOWSKII, sp. nov. (Plate VIII.)

E. supra rufa, intercapulio maculis nigris latissimis vario; superciliis latis, fascia genali, gula colloque antico supero albis; loris mystacibusque malaribus fusco-castaneis; area magna auriculari grisea; lateribus colli cinereis; regione jugulari pectoreque toto pallide cinerascens; abdomine medio albicante, area mediana magna obscure castanea; lateribus pectoris rufis, hypochondriis ochraceo-fulvis, subcaudalibus pallidioribus; alis nigricantibus, rectricibus minoribus cinereo late limbatis, mediis et majoribus pogonio externo rufo, apice albo; remigibus primariis albedo, secundariis et tertiariis rufo marginatis; cauda nigra, pogonio externo rectricum dimidio basali vivide rufo, rectricibus lateralibus binis partim albis.

♂ ad. Couleur générale des parties supérieures du corps est rousse, tirant un peu au rougeâtre brique, à sommet de la tête distinctement plus obscur et varié d'un certain nombre de stries noirâtres, très petites, terminales dans les plumes, les plus distinctes sur le cervix; le gris est dominant sur le devant même du front, les autres plumes du sommet de la tête très peu bordées d'une nuance pale; les plumes de la nuque et du

devant même du dos terminées largement par une bordure fauve roussâtre pale, les plumes du dos inférieur et du croupion sans bordures pareilles, qui ne se manifestent de nouveau que sur les tectrices supérieures de la queue et sur les scapulaires ; la région interscapulaire est traversée par une bande large au milieu, atténuée sur les deux côtés, composée de grosses stries noires médiaires dans les plumes, dont les bords latéraux sont largement d'un fauve rougeâtre et sur quelques unes des plumes d'un fauve jaunâtre. Sur les côtés de la tête la mode de la coloration est semblable à celui de l'*E. cioides*, Brandt, mais représenté par les couleurs différentes ; le blanc occupe une large raie sourcilière commençant finement sur les côtés du front et élargie fortement en arrière de l'œil, et par une large bande génale commençant au dessous des lores et descendant sur la partie antérieure des côtés du cou ; le marron obscur occupe les lores et une moustache malaire assez large, dont la base des plumes est noirâtre ; l'œil même entouré d'une fine bordure d'un marron foncé ; la grosse tache auriculaire est grise, de la même forme que la tache marron de l'*E. cioides*. La gorge et le haut du devant du cou sont d'un blanc pur, région jugulaire et la poitrine d'une nuancé cendré grisâtre très légère ; milieu de l'abdomen blanchâtre avec une grosse tache médiane oblongue d'un marron foncé (longue de $2\frac{1}{2}$, large d'1 centim.) ; côtés mêmes de la poitrine sont d'un roux un peu plus pale que celui du dos, côtés de l'abdomen d'un fauve roussâtre pale, les souscaudales un peu plus pales. Ailes noirâtres, les petites tectrices alaires bordées largement de cendré ; les bordures externes des tectrices moyennes et des grandes rousses, avec un liseré externe fauve ; la bordure terminale de ces tectrices largement blanche sur les deux barbes ; bordures externes des rémiges primaires fines blanchâtres passant au roussâtre vers la base des pennes, celles des secondaires rousses passant au blanchâtre vers l'extrémité ; dans les rémiges tertiaires les bordures sont plus larges, rousses bordées à l'extérieur de fauve pale ; barbes internes des rémiges bordées de blanc dans les trois quarts basals ; sousalaires et axillaires blanches, les premières à disque gris. Queue d'un noir brunâtre à barbe externe des rectrices longuement rousse

dans leur moitié basilaire, puis passant en une fine bordure blanchâtre ; dans la rectrice externe toute la barbe externe est blanche, et ce n'est qu'auprès de la base même que le blanc passe au roux ; la première et la deuxième rectrices latérales sont largement blanches dans leur partie terminale ; les deux rectrices médianes sont d'un gris brunâtre à barbe externe longuement rousse bordée de blanchâtre à ligne médiane, longuement noire le long de la baguette. Bec brun à mandibule inférieure plombée, l'extrémité noirâtre ; pieds d'un carné jaunâtre, à doigts d'une couleur sale ; ongles noirs ; iris brun foncé.

Longueur totale 168, aile 75, queue 70, bec 12, tarse 19, doigt médian 15, ongle 6.5 millimètres.

Unique exemplaire tué par M. Jankowski le 9 mars 1886, aux environs de Sidemi, dans le voisinage de la frontière de la Corée et de la Mantchourie Chinoise. Je profite de cette occasion pour dédier l'espèce à M. Michel Jankowski, qui depuis vingt ans continue avec ardeur l'exploration de la faune dans le pays Oussourien, d'où il nous a fourni un grand nombre de matériaux très précieux, et surtout pour l'ornithologie et l'entomologie.

Observations. Il est étonnant qu'un oiseau aussi remarquable ne fut trouvé pour la première fois qu'au bout de vingt ans de l'exploration continuelle de ce pays, tant plus qu'il n'a pas été trouvé dans tous les pays environnants dont la faune est assez bien connue. On sait parfaitement que les oiseaux de ce genre se trouvent partout en nombre plus ou moins considérable et ne se dérobent pas devant l'œil des explorateurs. On ne peut pas même supposer qu'on puisse prendre cette espèce au premier coup d'œil pour l'*Emberiza cioides*, semblable et très commun dans la contrée, car elle présente des caractères qui sont visibles à une distance assez éloignée. Où peut donc se trouver la région principale de l'habitat de ce bruant ?

